

Séminaire Formation JGEM SFES MAS :
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière Paris, 26 Janvier 2017
« Modélisation et Suivi en Vie Réelle-Regards croisés »

Bénéfice Net de Santé et Bénéfice Monétaire Net
Blanc Bonnet et Bonnet Blanc ?

Pr. Robert Launois

28, rue d'Assas
75006 Paris – France
Tel. 01 44 39 16 90 – Fax 01 44 39 16 92
E-mail : launois.reesfrance@wanadoo.fr – Web : www.rees-france.com



« IL EST TOUJOURS TROP TÔT POUR ÉVALUER, JUSQU'À CE QUE, SOUDAINEMENT, IL SOIT TROP TARD. »

Buxton 1987


Buxton MJ. Problems in the economic appraisal of new health technology: the evaluation of heart transplants in the UK.
In: Drummond MF. Economic appraisal of health technology in the European Community. Oxford Medical Publications, 1987:103-18



Quel modèle choisir?

Une Multitude Des Modèles Possibles

4




Les deux Variantes des Modèles Multi-États

5


Modèles de transitions Multi-États

Modèles de cohorte



Fluctuations d'échantillonnage


Modèles de Microsimulation



Variabilité inter-individuelle


FORCES ET FAIBLESSES DES DIFFÉRENTES MODÉLISATIONS

6



*Heeg BM1, Damen J, Buskens E, Caleo S, de Charro F, van Hout BA; Pharmacoeconomics. 2008;26(8):633-48.

COMMENT CHOISIR ?



SUR LA BASE DE QUELS CRITERES ?

8

- ❖ **Quel est le bon degré de granularité ?→unité de modélisation :**
 - **agrégée** sur un groupe de sujets présentant des caractéristiques communes (*modèle de cohorte/ agrégé*)? ou
 - **Individu centrée** pour refléter la spécificité des antécédents médicaux de chacun (*modèle individu centré /microsimulation/SED*) ?
- ❖ **Comment intégrer l'incertitude ? :**
 - Accepte-t-on de travailler à partir d'une **probabilité moyenne** de survenue (*modèle déterministe*) ? ou
 - S'intéresse-t-on à la variabilité des profils cliniques (*modèle probabiliste d'ordre 1*) ou à la difficulté d'appréhender les vraies valeurs des paramètres dans la population (*modèle probabiliste d'ordre 2*)
- ❖ **le temps doit il être pris en compte de façon implicite ou explicite? Doit il être mesuré à intervalles discrets (*microsimulation*) ou de façon continu (SED)?**
- ❖ **les individus interagissent ils entre eux?**
 - Ils n'ont pas d'interaction entre eux : → *modèle multi-états/ de Markov ou de microsimulation*
 - Ils interagissent-ils entre eux→ *modèle dynamique /à compartiments*

PROGRAMMATION SOUS EXCEL ?

9



Microsoft Excel

- Universellement disponible et largement accepté
- L'utilisation de Visual Basic pour Applications (VBA) lui donne une grande flexibilité
- Les feuilles de calculs rendent la mise en place d'interface du modèle relativement facile
- Le temps d'exécution du modèle peut être un problème quand il y a des interactions fréquentes entre VBA et la feuille de calcul
- La réalisation du modèle de microsimulation demande beaucoup de programmation de VBA qui n'est pas assez transparent pour les agences d'ETS

```
Sub PSA()  
~~~~~  
Dim x As Integer, trial As Integer, a As Integer, infiniteX As Integer, i As Integer  
Dim goodTrials As Integer  
Dim rge As Range  
Dim bErrorInTrial As Boolean 'new  
Dim FlagNetBen As Boolean  
Dim iterNumber As Integer  
  
iterNumber = 1000  
  
For i = 0 To iterNumber  
Range("PSA.Randcolumn").Value = Application.Index(RandomFullPSA, , i + 1)  
For Each rge In Range("macroPsaTrial") 'Test trial for any errors  
If Application.WorksheetFunction.IsError(rge) Then  
bErrorInTrial = True  
Exit For  
End If  
Next rge  
If bErrorInTrial = False Then 'If there is no error in trial then save trial result  
Range(Range("macroPsaStart").Offset(goodTrials, 1), Range("macroPsaStart").Offset(goodTrials, 9)).Value =  
Range("macroPsaTrial").Value  
Application.StatusBar = "Simulation: " & Round(goodTrials / 1000 * 100) & "% complete"  
goodTrials = goodTrials + 1  
If goodTrials = 1000 Then Exit For 'The required trials have been reached, then stop the loop  
  
Else 'There is an error in trial then update the number of errors  
infiniteX = infiniteX + 1  
If infiniteX > 100 Then 'If error in trial persists for more than 100x, then exit sub and report error  
Application.StatusBar = "Error found in PSA parameter. Please check your distributions."  
GoTo InfiniteLoopExit  
End If  
bErrorInTrial = False 'Reset bErrorInTrial tracker  
End If  
Call UpdateProgressBar(Round(((goodTrials - 1) / 1000) * 100) / 100, False)  
Next i  
  
'Net benefit  
....  
Application.StatusBar = False  
  
InfiniteLoopExit: 'goto used only if there is an infinite loop in PSA trials  
Range("bPSA").Value = False  
Sheets("PSA Results").Select  
Application.CutCopyMode = False  
  
End Sub
```




TRAITEMENT SOUS WINDOW : TREEAGE?

10



- Variables-compteurs (**tracker**) pour capturer les caractéristiques individuelles ;
- Nœuds logiques (**logic node**) pour programmer les transitions ;
- Matrice globale (**global matrix**).

$$M = \begin{pmatrix} Pat1 & HealthState(t0) & HealthState(t1) & \dots \\ Pat2 & HealthState(t0) & HealthState(t1) & \dots \\ \dots & HealthState(t0) & HealthState(t1) & \dots \\ Patn & HealthState(t0) & HealthState(t1) & \dots \end{pmatrix}$$





**Quelle simulation numérique
monte carlo d'ordre 1 ou 2?**


TYPES DE MONTE-CARLO

12

- **Simulation de premier ordre** : l'itinéraire d'un individu est tiré au hasard Le devenir d'un patient dans l'arborescence:
 - On compare la valeur (R) prise par une variable aléatoire tiré **d'une loi de distribution uniforme** comprise entre 0 et 1 à **une probabilité fixe (p)** de chacun des événements qui se trouve sur son chemin
 - Sur un grand nombre d'itinéraires, on retrouve la probabilité de survenue de chaque conséquence possible. Seule la variabilité est étudiée, l'incertitude ne l'est pas car la **stratégie optimale reste toujours la même.**
- **Simulation de second ordre** : tirage au sort de chaque variable aléatoire en fonction de sa loi de probabilité, puis calcul des résultats attendus
 - Prise en compte de l'incertitude sur les variables
 - Selon les valeurs obtenues, le choix de la stratégie optimale pourra différer
- **Simulation de troisième ordre** : combinaison des deux simulations précédentes
- TreeAge® permet les trois variantes

PRINCIPE DU RÉ-ÉCHANTILLONNAGE

13



La technique comporte quatre étapes :

1. Tirages aléatoires **avec remises** successives de n individus appartenant au groupe témoin (T) et calcul du coût total **moyen** et de l'efficacité totale **moyenne de cet échantillon reconstitué du groupe témoin**
2. Tirages aléatoires **avec remises** successives de n individus appartenant au groupe expérimental (X) et calcul du coût total moyen et de l'efficacité totale moyenne de cet échantillon **reconstitué du groupe expérimental**
3. Calcul **par différence** du ratio coût efficacité différentiel entre les deux groupes ré-échantillonnés
4. **Répétition de l'opération B fois** pour obtenir une estimation de la distribution de C_T et C_X ; E_T et E_X de leur différences avec leur IC

CONSTITUTION D'UN ECHANTILLON

15


Deux groupes indépendants

Groupe Témoin		Groupe Expérimentale	
Patient	(Coût, Effet)	Patient	(Coût, Effet)
1	(C_T^1, E_T^1)	1	(C_X^1, E_X^1)
2	(C_T^2, E_T^2)	2	(C_X^2, E_X^2)
3	(C_T^3, E_T^3)	3	(C_X^3, E_X^3)
▪		▪	
▪		▪	
n_c	(C_T^n, E_T^n)	n_T	(C_X^n, E_X^n)
Moyenne de l'échantillon :		Moyenne de l'échantillon	
$(\bar{C}_T, \bar{E}_T)$		$(\bar{C}_X, \bar{E}_X)$	

SIMULATION NUMÉRIQUE PAR RÉ-ÉCHANTILLONNAGE

16


EFFECTIF dans l'échantillon initial du groupe contrôle $n=3$:



SIMULATION D'UNE VARIABLE DISCRÈTE

17

- Soit une loi de probabilité discrète définie par $P(X = x_i) = p_i$ pour $i = 1, \dots, n$ (ex. attribution du traitement en première ligne)




- La règle d'affectation est suivante:
 - $0 \leq x < p_1$ alors $X = x_1$
 - $p_1 \leq x < p_2$ alors $X = x_2$
 - ...

SIMULATION D'UNE VARIABLE CONTINUE A PARTIR DE LA FONCTION DE RÉPARTITION INVERSE CUMULÉE

18

- Un nombre aléatoire uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$ est utilisé pour sélectionner les valeurs de la fonction de répartition inverse cumulée
- L'abscisse représente la fonction de répartition inverse cumulée de la loi de répartition cumulée




- La technique du Monte Carlo est opérationnalisée en quatre étapes :
 1. Tirage aléatoire **à partir des distributions de probabilité** d'une valeur pour chaque paramètre caractéristique du **groupe test** et calcul du coût total et de l'efficacité totale
 2. Tirage aléatoire **à partir des distributions de probabilité** d'une valeur pour chaque paramètre caractéristique du **groupe contrôle** et calcul du coût total et de l'efficacité totale correspondantes
 3. **Calcul par différence** du ratio différentiel coût résultat correspondant
 4. **Répétition de l'opération B fois** pour obtenir une estimation de la distribution du RDCR dans le plan ACR

SIMULATION PARAMETRIQUE DE MONTE CARLO D'ORDRE 2

20

- ❖ Faire une typologie de ces sacs,
- ❖ définir leur forme à partir d'un petit nombre de paramètres
- ❖ simuler des tirages au hasard issus de ces lois




- Probabilités $[0 ; 1]$: loi Beta
- Risques relatifs $[0 ; \infty[$: log normale ou loi Gamma
- Utilité $]-\infty ; 1]$: loi Beta ou Normale tronquée à 1
- Coûts $[0 ; \infty[$ loi Gamma ou Lognormale
- Valeurs inconnues : Loi Uniforme non informative



Etude de Cas Monte Carlo d'ordre 1 EMOCAR

ETUDE DE CAS : ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE ESSAI RANDOMISÉ EMOCAR

23



→ **Étude coût-utilité:**

Surcoût supplémentaire pour *une amélioration de la qualité de vie*

→ **Point de vue adopté collectif (hôpital – ambulatoire – famille)**

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

- ◆ **Objectif principal clinique:**

Démontrer que la mesure de l'oxymétrie cérébrale en continu par le système INVOS™ (rSO2) lors d'endarterectomies carotidiennes permet de réduire significativement l'apparition de nouvelles lésions ischémiques radiologiques en postopératoire, grâce à une optimisation hémodynamique cérébrale pendant la période de clampage carotidien.

- ◆ **Objectif principal médico-économique:**

Evaluation du rapport coût-utilité de l'utilisation d'INVOS™ versus pratique courante

- ◆ **Critère principal:**

Nombre de nouvelles lésions cérébrales ischémiques par IRM de diffusion en postopératoire (comparées au nb de liaisons en pre-opératoire)

- ◆ **Hypothèse:**

La différence cliniquement pertinente retenue, pour démontrer l'avantage de l'usage du NIRS par rapport au suivi classique est une diminution de 50% des nouvelles lésions cérébrales

→ Le nombre de sujets nécessaires pour démontrer cette différence est de 978

EQ-5D, SF-36, QUESTIONNAIRES D'UTILISATION DES RESSOURCES , GRILLE AGGIR

25

	Selection	Baseline J ₀	J ₀ +30	J ₀ +60	J ₀ +90	J ₀ +120
EQ-5D		X	X			X
SF-36		X	X			X
Questionnaire d'utilisation de ressources durant le dernier mois		X	X	X	X	X
Grille AGIR (par le médecin)	X					X

POPULATION REJOINTE PER PROTOCOLE

26


Baisse de NIRS	INVOS [®]		Total
	Aveugle	Utilisé	
> 15 %	183	171	354
< 15 %	180	202	382
Non documenté	35	22	57
Total PP	398	395	793

LES RATIOS COÛT RÉSULTAT DIFFÉRENTIEL SUR 354 000 CAS

27


Traitement	Coût total (€)	Ecart-type	QALY	Ecart-type
NIRS Utilisé	8995,06	495,56	0,270	0,012
NIRS Aveugle	9236,84	654,70	0,307	0,018

Traitement	RDCR (€)
NIRS Utilisé	6 630,29
NIRS Aveugle	




VARIANTES SUR LE NIVEAU D'EFFORT FINANCIER SOCIALEMENT ACCEPTABLE

Seuil $\lambda = 5\,000\text{€}$



Seuil $\lambda = 20\,000\text{€}$




VALEURS DE RÉFÉRENCE RECOMMANDÉE PAR L'OMS

29

- ❖ Pour l'OMS, la valeur du seuil pourrait être fixée en proportion **du produit intérieur brut par habitant**. Un traitement dont le ratio surcoût/ surcroît d'efficacité par rapport à son comparateur est
 - inférieur ou égal à **une fois la production par habitant** sera considéré comme **très efficient**.
 - On le jugera **efficient** lorsque sa valeur est comprise **entre une fois et trois fois la valeur du PIB par habitant et**
 - il sera dit **inefficient lorsque sa valeur est supérieure à trois fois** celle du PIB par habitant
- ❖ La valeur du seuil varie donc en fonction de la richesse des pays où les analyses coût-efficacité sont conduites : 115 000 \$ _[2014 FMI] pour Le Luxembourg, 54 609 \$ _[2014 FMI] pour les Etats-Unis, 45 925 pour l'Allemagne, 44730 \$ la France .
- ❖ Le corridor acceptable d'efficienne s'établirait aujourd'hui en France entre 32 000 € et 96 000 € _[2013 insee base 2010]


CALCUL POUR UNE VALEUR DE $\lambda = 32\ 000\text{€}$

30



COURBES D'ACCEPTABILITÉ DES RATIOS COÛT RÉSULTAT EN FONCTION DE LA VALEUR DE λ [CAC_{CR}]

31



LES CAC_{CR} N'ONT PAS NÉCESSAIREMENT UN TRACÉ SIGMONOÏDALE

32

• La CAC_{CR} D'INVOS


- Ne part pas de l'origine, mais de 61,8 % puisque 61,8% des points qui figurent dans le plan ACR, sont localisés dans les quadrants SO et SE en dessous de l'axe horizontal ; INVOS est donc moins cher que son comparateur la surveillance anesthésique standard. Il est choisi pour cette raison même lorsque la disposition à payer est nulle.
- Ne tend pas vers 100% mais vers 3,3 % puisque 3,3 % seulement des expérimentations se trouvent à droite de l'axe vertical, ce qui correspond à une augmentation de la qualité de vie. Si la collectivité était prête à dépenser 100 000€ pour améliorer la qualité de vie dans cette indication celle-ci ne s'améliorerait que de 3%.


• La CAC_{CR} surveillance anesthésique standard

- A une ordonnée à l'origine de 38% puisque 38 % des points du plan ACR sont en dessous de l'axe horizontal. Ce qui correspondent à un niveau d'économies inférieur à celui d'INVOS lorsque la disposition à payer est nulle.

Frontière des Meilleurs Traitements Financièrement Acceptables [FMT_{FA}] peut être tracée dans la cadre d'une étude à deux bras

33





Etude de Cas Monte Carlo d'ordre 2

Rifaximine vs Lactose

VARIABILITE INTER-INDIVIDUELLE ou INCERTITUDE SUR LA VALEUR VRAIE D'UN PARAMETRE DANS LA POPULATION

35

» Modèles « individus centrés » :


- C'est la **distribution du paramètre** T (la taille par ex) **dans l'échantillon** qui nous intéresse pour pouvoir les utiliser comme estimateurs des paramètres liés à la population.
- Loi Normale : $T \sim \text{Norm}(\bar{X}, s^2)$, avec :
 - $\bar{X}$ = moyenne de l'échantillon
 - s^2 = variance estimée à partir de l'échantillon

» Majorité des modèles en évaluation économique. Modèles à l'échelle d'une population

- C'est la **distribution de l'espérance du paramètre** qui nous intéresse. $E[T]$ est la valeur centrale d'une distribution de probabilité qui est une représentation de l'incertitude de la moyenne dans la population, alors que la moyenne caractérise un échantillon]
- Loi normale : $E[T] \sim \text{Norm}(\mu, \sigma^2)$,
 - $\sigma^2 = s^2/n$ est une représentation de l'incertitude sur la variabilité de la moyenne dans la population


PRINCIPE DE CONSTRUCTION D'UNE COURBE D'ACCEPTABILITÉ

36




EFFICIENCE DE L'INNOVATION EN FONCTION LA VALEUR DE L'EFFORT FINANCIER SOCIALEMENT ACCEPTABLE

37



COURBE DE PROPORTION DE CAS GAGNANTS


57



EFSA	Trt 1	Trt2
1 000 €	100,00%	0,00%
2 000 €	100,00%	0,00%
3 000 €	100,00%	0,00%
...		
8 000 €	99,70%	0,30%
9 000 €	95,70%	4,30%
10 000 €	84,60%	15,40%
11 000 €		
12 000 €		
...		
80 000 €		

COURBE DES PROPORTIONS DE CAS GAGNANTS



39



EFSA	Tr1	Tr2
1 000 €	100,00%	0,00%
2 000 €	100,00%	0,00%
3 000 €	100,00%	0,00%
...		
9 000 €	95,70%	4,30%
10 000 €	84,60%	15,40%
11 000 €	67,90%	32,10%
12 000 €	51,70%	48,30%
...		
27 000 €	0,40%	99,60%

80 000 €


RECAP : DROITE ET COURBE DES RATIO FINANCIEREMENT ACCEPTABLES CAC_{RA}



LA COURBE D'ACCEPTABILITÉ : QUELLE EST LA PROBABILITÉ DE NE PAS SE TROMPER DANS SES CHOIX?


41

EFSA	Lactulose	Rifaximine
1 000 €	100,00%	0,00%
2 000 €	100,00%	0,00%
3 000 €	100,00%	0,00%
...		
8 000 €	99,70%	0,30%
9 000 €	95,70%	4,30%
10 000 €	84,60%	15,40%
11 000 €	67,90%	32,10%
12 000 €	51,70%	48,30%
...		
80 000 €	0,00%	100,00%




COURBES D'ACCEPTABILITÉ DES RATIOS COÛT RÉSULTAT: CAC_{CR}

42



LA COURBE DES MEILLEURS TRAITEMENTS FINANCIEREMENT ACCEPTABLES DANS UNE ETUDE A DEUX BRAS

43





Nouvelle métrique le bénéfice net

RAISONNER EN DIFFERENCE DE VALEUR

45

LA VALEUR DE LA SANTÉ GAGNÉE EXCÈDE-T-ELLE, CELLE DE LA SANTÉ PERDUE?

- **LE BÉNÉFICE DE SANTÉ DIFFÉRENTIEL NET [BSDN]** est égal aux gains de santé qu'entraîne l'innovation pour la population (ΔE) moins les pertes de santé ($\Delta C/\lambda$) qu'elle induit en mobilisant des ressources au détriment d'autres priorités sanitaires.

$$\text{BSDN} = \Delta E - \Delta C / \lambda \quad (\text{ex: } \Delta C / \lambda = 100\,000 / 20\,000 \rightarrow 5 \text{ Qalys perdus})$$

- **LE BÉNÉFICE MONÉTAIRE DIFFÉRENTIEL NET [BMDN]** est égal au surcroît d'efficacité (ΔE), de l'innovation, valorisé sur la base d'un niveau donné de l'effort financier socialement acceptable (λ) déduction faite des dépenses additionnelles qu'il faut engager pour l'obtenir (ΔC)

$$\text{BMDN} = \lambda * \Delta E - \Delta C$$

OU RAISONNER EN VALEUR ABSOLUE

46

- Le **bénéfice net de santé [BNS]** d'un nouveau traitement est défini en mettant en balance :
 - *La santé que rapporte* l'innovation (E)
 - *Les préjudices de santé qu'elle crée* (C/λ)

$$\text{BNS} = E - [C / \lambda] \quad [\lambda = \text{la valeur sociale de l'unité de résultat}]$$

- Le **bénéfice monétaire net [BMN]** est l'expression monétaire de l'efficacité de l'innovation, valorisé en fonction de l'effort financier socialement acceptable (λ) déduction faite des dépenses engagées pour l'obtenir.

$$\text{BMN} = \lambda * E - C$$

AUCUNE IMPORTANCE LES DEUX MODES DE CALCUL DONNE LE MÊME RESULTAT

47

Simulation	BMN		Probabilité que la différence entre le # de cas gagnants soit > 0		Probabilité qu'un des deux traitements soit supérieur à l'autre		Traitement optimal
	Txt 1	Txt2	BMDN	BMDM > 0	Max (BMN _{Txt1})*	Max(BMN _{Txt2})*	
1	21 538	18 537	3 001 €	1	1	0	Txt 1
2	23 399	15 248	8 152 €	1	1	0	Txt 1
3	25 997	22 090	3 907 €	1	1	0	Txt 1
4	24 992	20 477	4 515 €	1	1	0	Txt 1
5	21 868	16 115	5 754 €	1	1	0	Txt 1
...	...	...	...	...	...	...	...
81	39 459	40 143	-684 €	0	0	1	Txt 2
...	...	...	...	...	...	...	...
1000	20 308	19 110	1 199 €	1	1	0	Txt 1
Moyenne	26 238	21 820	4 417	P = 0,985	P(BMN ₁) = 0,985 P(BMN ₂) = 0,015		Txt 1

pour une Valeur de $\lambda=24\ 000\text{€}$

RAISONNER EN BÉNÉFICE DE SANTÉ NET OU EN BÉNÉFICE MONÉTAIRE NET

48

- ♦ **Le Bénéfice de Santé Net [BSN]** d'un nouveau traitement est défini en mettant en balance :
 - La santé que rapporte l'innovation (E)
 - Les préjudices de santé qu'elle crée (C/λ)

$$BSN = E - (C/\lambda) \quad [\lambda = \text{la valeur sociale de l'unité de résultat}]$$

- ♦ **Le Bénéfice Monétaire Net [BMN]** est l'expression monétaire de l'efficacité de l'innovation, valorisé en fonction de l'effort socialement acceptable (λ) déduction faite des dépenses engagées pour l'obtenir

$$BMN = \lambda * E - C$$

AUCUNE IMPORTANCE LES DEUX MODE DE CALCUL DONNE LE MÊME RESULTAT

49

pour une Valeur de $\lambda=24\ 000\text{€}$

L'avantage pour la santé publique est il avéré, lorsqu'il est mesuré ?

Traitement A	
QALY	Coût
1	20,000 €
0	40,000 €
2	30,000 €
1	30 000 €

Traitement B	
QALY	Coût
2	50,000 €
8	50,000 €
5	80,000 €
5	60 000 €

- En termes de Bénéfice de Santé Différentiel Net (BSDN)

$$\text{BSDN} = 4 - \frac{30\ 000\ \text{€}}{24\ 000\ \text{€}} = 4 - 1,25 = \text{OUI} : 2,75 \text{ AVAQ gagnées}$$

- En termes de Bénéfice Monétaire Différentiel Net (BMDN)

$$\text{BMDN} = 4 \times 24\ 000\ \text{€} - 30\ 000\ \text{€} = 66\ 000\ \text{€} = \text{OUI} : 2,75 \text{ AVAQ gagnées}$$

RECAP : MODALITES DE CALCUL DU BÉNÉFICE DE SANTÉ NET

50

1. Réalisation de N (1000) expérimentations
2. Choix d'une plage de niveaux d'effort socialement acceptable (λ_i)
3. Calculs du Bénéfice Monétaire Net[BMN] = $\lambda_i * QALY - \text{Coût}$
4. Identification de la stratégie qui maximise le BMN à chaque expérimentation
5. Sommation des cas gagnants sur l'ensemble des simulations
6. Illustration : courbe des proportions de cas gagnants par rapport aux concurrents pour différents niveaux de l'effort socialement acceptable

POUR S'ASSURER D'AVOIR BIEN COMPRIS !!

CALCUL DU BMN POUR UNE VALEUR DE $\lambda = 24\ 000\text{€}$

51

Traitement 1		Traitement 2		BMN		Probabilité que l'innovation soit efficiente			
Simulation	QALY	Coût	QALY	Coût	Txt 1	Txt2	Max (BMN Txt1)*	Max(BMN Txt2)*	Traitement optimal
1	1,28	9 223	0,94	4 001	BMN = λ * E - C BMN Txt1 >? < BMN Txt2				
2	1,36	9 275	0,81	4 303					
3	1,53	10 744	1,14	5 365					
4	1,51	11 220	1,11	6 242					
5	1,34	10 209	0,87	4 716					
...	...	...	...	...					
81	2,28	15 373	2,01	8 140					
...	...	...	...	...					
1000	1,20	8 576	0,97	4 233					
Moyenne	1,55	10 881	1,15	5 710					

CONCLUSION

52



Archibald Cochrane

Exiger des moyens sur la base de données épidémiologiques ou de faits scientifiquement démontrés est indispensable mais ne suffit plus. Les conséquences médico-économiques de la décision sont désormais à prendre impérativement en compte



Prof. Robert Launois
REES France

♦ **Adresse:** REES France
28, rue d'Assas
75006 Paris, France

♦ **Téléphone:** +33 (0)1 44 39 16 90

♦ **Email:** launois.reesfrance@wanadoo.fr

♦ **Web:** www.rees-france.com

Réseau d'Evaluation en Economie
de la Santé

